

ALBERI A CAMPERTOONO

Per l'abbondanza della sua vegetazione, non a torto la Valsesia è indicata spesso come "valle verde".

Sono qui indicate solo le specie spontanee più comuni esistenti nel territorio di Campertogno, elencate secondo il nome dialettale in ordine alfabetico.

Di ciascuna sono riportati i nomi dialettale, italiano e botanico. Sono possibili errori di classificazione botanica, dovuti alla personale incompetenza.

Le località indicate si riferiscono a concentrazioni significative di esemplari e riflettono l'esperienza personale; le altitudini riportate sono approssimative. Di fatto quasi tutte le specie sono reperibili sporadicamente sull'intero territorio, ovviamente nelle fasce altimetriche pertinenti. Solo nel caso del tasso esiste attualmente un'unica colonia accertata, situata poco a monte dell'Alpe Bundi Inferiore.

àigru: acero (*Acer pseudoplatanus L.*)
comune sotto 1500 m

àlbina: pioppo bianco (*Populus alba L.*)
sporadico sotto 1000 m

arburèlla: pioppo tremulo (*Populus tremula L.*)
sporadico sotto 1700 m

arólu (anche **aróla**): rovere, quercia (*Quercus robur L.*)
Uriâ; sporadico sotto 1500 m

arsàlla (anche **arsaliñ**): sorbo montano (*Sorbus aria Crantz*)
Caudrùñ; comune tra 1000 e 1700 m

auniçça (anche **uniçça**): ontano bianco (*Alnus incana Moench*)
comune sotto 1500 m

avèi: abete bianco (*Abies alba Mill.*)
Bosc Grand e Valle Artogna; comune sotto 1800 m (ovago)

avèrna (anche **góra**): ontano rosso (*Alnus glutinosa Gaertn.*)
comune sotto 1500 m

bargnùñ (anche **bargnòla**): pruno (*Prunus spinosa L.*)
sporadico sotto 1500 m

bóla: betulla (*Betula pendula* Roth)

Lagùñ e Buràcchi; comune sotto 1700 m

castignã (anche **castignùñ** o **salvàig**): castagno (*Castanea sativa* Mill.)

Uriâ; comune sotto 1500 m

çiréša (anche **çiréšö**): ciliegio selvatico (*Prunus avium* L.)

Buracchi; sporadico sotto 1500 m

culòra (anche **niculê**): nocciòlo (*Corylus avellana* L.)

Buràcchi; comune sotto i 1700 m

dròs: ontanello, ontano di monte (*Alnus viridis* Chaix)

comune sopra i 1500 m

éigu (anche **déigu**): maggiociondolo (*Laburnum anagyroides* Medik.)

Argnàcça; sporadico tra 1000 e 1500 m

fò: faggio (*Fagus sylvatica* L.)

Lagùñ e Callone; comune tra 1000 e 1500 m

fràssu: frassino (*Fraxinus excelsior* L.)

comune sotto 1500 m

gagìa (anche **rubìnia**): robinia (*Robinia pseudoacacia* L.)

sporadico sotto 1000 m

làras (anche **làres**): larice (*Larix decidua* Mill.)

Strâ 'd l'ör e Valle Artogna; comune sotto i 2000 m

nast: tasso (*Taxus baccata* L.)

Bùndi (unica colonia esistente; segnalato storicamente sotto all'Argnàcça)

nèspu: nespolo (*Mespilus germanica* L.)

sporadico sotto 1000 m

nós: noce (*Juglans regia* L.)

Versüra e Uriâ; comune sotto 1500 m

òlmu: olmo (*Ulmus glabra* Huds.)

Scàrpiã; sporadico sotto 1500 m

pècça: abete rosso (*Picea excelsa* Link.)

Bosc Grand e Valle Artogna, comune sotto 1800 m (ovago)

pómm (anche **pumëtt**): melo selvatico (*Malus sylvestris Mill.*)
sporadico sotto 1500 m

pübbia: pioppo (*Populus nigra L.*)
sporadico sotto 1000 m

salasiñ (anche **sàles**): salice (*Salix alba L.*)
sporadico sotto 1000 m

tìa: tiglio (*Tilia cordata Mill.*)
Versura dei Tetti; comune sotto 1500 m

tramulina (anche **tumbulina**): sorbo degli uccellatori (*Sorbus aucuparia L.*)
Strìcchi; comune tra 1000 e 1700 m